Institut royal des Sciences naturelles de Belgique

BULLETIN

Tome XXX, n° 10
Bruxelles, avril 1954.

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

MEDEDELINGEN

Deel XXX, nr 10
Brussel, April 1954.

NUEVAS ESPECIES DE CLAVIGER DE LA PENINSULA IBERICA (COLEOPTERA PSELAPHIDÆ),

por Joaquin Mateu (Almería).

Este interesante grupo de coleópteros fué antiguamente considerado como una familia independiente próxima a los *Pselaphidæ*, hasta que recientemente, en el año 1949, el Dr. Jeannel en su obra sobre los Pselaphidos del Africa Oriental la trasladó a la gran familia de los *Pselaphidæ* a titulo de subfamilia. (Mém. Mus. Nat. Hist. Nat., XXIX, p. 15, Paris, 1949) ; en dicho trabajo se ocupa de agrupar los numerosos géneros africanos repartiéndolos en diversas tribus. En Europa se encuentra tan sólo el género *Claviger* Preyssler incluido en la tribu *Clavigerini* Jeannel constituida para agrupar los clavigéridos que poseen tricomas sobre los élitros y el primer tergito abdominal, insectos de pequeña talla, miembros cortos y por lo general asociados a las hormigas del género *Lasius* en cuyos hormigueros se les encuentra.

Unas veinticuatro especies son conocidas de Europa y algunas otras del Africa del Norte. En el siglo pasado cuatro especies fueron descritas de la Península, estas son : *C. saulcy* Ch. Brisout (del Escorial), *perezii* (Saulcy) Reitter (del Escorial), *piochardi* Saulcy (de Asturias) y *lusitanicus* Saulcy (de Serra-Gerez, Portugal). A estas cuatro debemos añadir dos más que a continuación describiremos procedentes del Levante y Mediodia de España. En las colecciones del Museo de Bar-

celona cuyos materiales nos han sido comunicados amablemente por D. Francisco Español, hemos encontrado unos ejemplares del *C. longicornis* P. W. Muller con la etiqueta de localidad que dice : Barcelona, ex-coll. Martorell y Peña. Es muy posible que, en efecto, esta especie se halle también en nuestra Patria ya que se la conoce de los Pirineos Orientales y Bajos Pirineos en localidades próximas a nuestra frontera, pero debemos tomas esta cita con ciertas reservas, pues la colección Martorell adolece del defecto — bastante general a las colecciones antiguas —, de su mal etiquetaje y de los correspondientes cambios y trastornos ocurridos necesariamente a lo largo de su casi centenaria existencia. Por eso precisa de una confirmación reciente que permitiría definitivamente la inclusion del *C. longicornis* en el acerbo faunístico de España.

Lo mismo que la especie antes mencionada, es posible se hallen en el norte de la Península (Pirineos) tres otras especies conocidas de la vertiente francesa : *C. pouzeaui* Saulcy (Pirineos Orientales y Albères), *C. pyrenæus* Raffray (Pirineos occidentales) y *C. brucki* Saulcy (Pireneos orientales y Canigó).

Nuestro buen amigo D. Antonio Cobos recolectó en junio de 1949 en el Escorial y Puerto de Navacerrada las dos especies descritas del Guadarrama, *C. perezii* (Saulcy) Rtt. y *C. saulcy* Ch. Brisout (Fig. 3). En abril de 1946 durante una corta campaña entomológica, y más particularmente biospeológica, encontramos en compañia de F. Español otra especie de *Claviger* en un hormiguero de los cerros que circudan el pueblo de Adzaneta en la provincia de Castellón de la Plana, y finalmente el mes de mayo del año pasado en la Sierra Alcojona (S. de Ronda), en la provincia de Málaga, recogimos una especie que como la anterior ha resultado ser nueva para la ciencia y que describimos en la presente nota.

Claviger (s. str.) cobosi sp. nov. (Fig. 1.)

Tipo. — Una ♀ de la Sierra Alcojona, Ronda prov. de Málaga, V-1949 (Mateu coll.).

Long. 2 mm. De un color testáceo-rojizo poco brillante. Puntuación fina y poco densa ; la pubescencia amarillenta, más larga y esparcida sobre la cabeza y protórax ; sobre los élitros más corta densa y regular y sobre el abdomen larga, entremezclada y algo más densa que sobre la cabeza y tórax. Cabeza

Ad. Goemaere, Imprimeur du Roi, 21, rue de la Limite, Bruxelles